

Patiënteninformatie

Bronchoscopie



Voorwoord

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er een bronchoscopie wordt uitgevoerd.

Als aanvulling op de uitleg die u reeds kreeg van uw longarts biedt deze informatiebrochure u bijkomende informatie.

Bij vragen kan u steeds terecht op de volgende telefoonnummers:

Polikliniek Pneumologie:	☎ 03 491 27 41
Verpleegafdeling Pneumologie – B3	☎ 03 491 33 91
Dagziekenhuis	☎ 03 491 22 35
Spoedgevallen	☎ 03 491 29 10
Behandelende arts-specialist	☎ na afspraak (via 03 491 23 45)

Het ganse team wenst u een spoedig herstel toe!

1. Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een speciaal daarvoor ontworpen toestel (bronchoscoop) in de longen kijkt.



2. Voorbereiding op het onderzoek

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen niet eten of drinken vanaf 4 u voor het onderzoek.

Medicatie mag u wel innemen met een klein beetje water. Bloedverdunnende medicatie zoals Marevan®, Plavix®, Marcoumar®, Sintrom®, Xarelto®, Pradaxa®,... mogen **niet** ingenomen worden.

Indien u bloedverdunnende medicatie neemt gelieve dit dan op voorhand aan de arts te melden.

3. Opname op het dagziekenhuis

- U meldt zich eerst aan bij de opnamebalie in de centrale inkomhal. De opnamebediende schrijft u in als patiënt en verwijst u verder door naar het dagziekenhuis waar men u zal voorbereiden voor uw onderzoek.
- U neemt bij uw opname een lijst met uw thuismedicatie mee.

4. Op het dagziekenhuis of de verpleegafdeling

- U krijgt een operatieschortje aangeboden.
- Er kan op advies van de arts een infuus geplaatst worden in de arm.
- Er gebeurt een bloedname (indien er geen recente bloedname uitgevoerd werd) om de stolling van het bloed te controleren.
- Om slijmvorming in de luchtwegen tegen te gaan krijgt u Atropine® ingespoten in de bilspier.
- U krijgt een tabletje (Xanax®) om u beter te kunnen ontspannen tijdens het onderzoek. U kan hiervan slaperig worden.
- U krijgt Duovent® via een aerosolmasker om de luchtwegen open te zetten.
- Uw gebitsprothese en bril laat u op de kamer (in de voorziene kluisjes).

5. Verloop van het onderzoek

De interne vervoersploeg brengt u in bed naar de onderzoekskamer.

Bij het begin van het onderzoek zal de longarts uw keel en stembanden verdoven met Xylocaïne spray®.

U krijgt extra zuurstof via de neus met een neusbrilletje.

Het onderzoek kan gebeuren via de mond of in sommige gevallen via de neus. De verpleegkundige plaatst een mondstuk tussen de tanden om te vermijden dat er op het toestel gebeten wordt tijdens het onderzoek.

De longarts zal met zijn toestel de longen gaan inspecteren. Tijdens het onderzoek kan een hoestreflex optreden, maar dit wordt verminderd door het bijkomend verdoven van de longen/luchtwegen. Bij het onderzoek kan de longarts een stukje weefsel (biopsie) nemen om dit verder te laten onderzoeken.

De slijmen die in de longen aanwezig zijn worden opgezogen en worden eveneens onderzocht in het laboratorium.

De bronchoscopie duurt ongeveer 10 minuten (voorbereiding inbegrepen).

6. Risico's

Bronchoscopie is een veilig onderzoek. Zeldzame complicaties zijn longbloeding, perforatie van de long, laag zuurstofgehalte,.... Mochten deze complicaties optreden dan worden deze behandeld. Verdere uitleg krijgt u van uw arts.

7. Na het onderzoek

Omdat u zich nog zou kunnen verslikken door de keelverdooving mag u tot 2 uur na het onderzoek niets eten en drinken.

Een lichte temperatuurverhoging kan optreden na het onderzoek.

U kan wat duizelig zijn of zich vermoeid voelen vermits u een ontspannend middel gekregen hebt. Het kan soms enkele uren duren voordat de medicatie is uitgewerkt.

8. Naar huis

Vermits u een ontspannend middel gekregen hebt, mag u de dag van het onderzoek zelf geen voertuigen besturen en dient u afgehaald te worden door uw familie/kennissen.

Het tijdstip van ontslag wordt u meegedeeld door de longarts.

9. Resultaten van het onderzoek

De longarts vertelt u na afloop van het onderzoek de bevindingen en meldt dit aan uw huisarts (indien u bij uw inschrijving hier toestemming voor gegeven hebt).

10. Wanneer een arts raadplegen na thuiskomst?

Bij pijn op de borst, bij plotse ademhalingsproblemen, bij blijvende koorts, bij ophoesten van (veel) bloed.

U kan contact opnemen met uw huisarts of de dienst spoedgevallen van het H.-Hartziekenhuis op het nummer 03 491 29 10.

11. Wat te doen in geval van verhindering?

- Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen neem dan, minstens 24 uur vooraf, contact op met de polikliniek tussen 09 uur en 16 uur, op het telefoonnummer 03 491 27 41.
- U kunt dan wellicht een nieuwe afspraak maken en in uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

Als u na het lezen van deze infobrochure nog **vragen** heeft in verband met deze ingreep, **aarzel niet** ze te stellen aan uw vaatchirurg of verpleegkundige van de afdeling.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

© 2017 H.-Hartziekenhuis

H.-Hartziekenhuis | Mechelsestraat 24, 2500 Lier | www.hhzhlier.be
T: 03/491 23 45 | Afspraken 03/491 27 20 - 03/491 27 41